

C T 検査のお申し込み手順

検査種類	一般C T 検査 (単純・造影)		心臓冠動脈造影 C T 検査
申込方法	F A X	電話	電話
電話番号	0 4 2 - 7 4 2 - 3 5 9 5	0 4 2 - 7 4 2 - 3 5 8 2	0 4 2 - 7 4 2 - 3 5 8 2
受付時間	2 4 時間対応	8 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0	8 : 3 0 ~ 1 6 : 3 0
申込方法	当院指定の情報提供書に記入、または貴院の情報提供書に以下の事項を記載の上、F A X にてお送りください ①検査部位 ②検査目的 ③撮影希望日時 (10分刻みでご指定ください) ④患者様の氏名 ⑤生年月日 ⑥住所		担当者にご相談しながらご予約をお取りします 電話終了後、当院指定の情報提供書をご記入の上 F A X にてお送りください 貴院の情報提供書の場合は左記の同様①~⑥、⑦前処置の有無を記載して下さい 【前処置：有】の場合、以下の①または②を指定 ①βブロッカー+硝酸薬 ②硝酸薬単体 *当院循環器内科医師の結果説明をご希望の場合は、別途診察予約が必要です (金曜日午後)
検査時間	9 : 0 0 ~ 1 6 : 4 5 (土曜日 9 : 0 0 ~ 1 2 : 3 0) ※時間外検査は、ご相談下さい		
持ち物	1. 健康保険証 2. 情報提供書 (F A X した原本) 3. 当院の診察券 (初めてのの方は結構です) 4. 造影C T 検査をご希望の方は当院専用の同意書		
ご来院時間	ご予約の検査時間の10分前までに、 総合受付にお越しください		検査前の心拍観察の為、 予約時間2時間前までに 総合受付にお越しください
検査結果の返信	検査当日に画像データ (C D) ・検査所見を患者様にお渡しします ご希望により郵送でのお届けも承りますので、事前にご連絡をお願いします 診断医不在の場合は、郵送でのお届けとなる場合があります		紹介先医療機関様にご郵送いたします

お願い	造影C T 検査を希望の時は、以下の説明をお願いします 1. 造影剤の副作用 2. 食事の制限など (飲水は可) 3. 検査前処置の説明 4. ビグアナイド系糖尿病薬服用者への説明 *当院指定の検査同意書のご記入をお願いします*	
心臓冠動脈検査の ご注意	・前処置薬βブロッカーを服用して心拍60回/分以上の患者様は、良好な画像が得られない場合があります	

CT 検査でご来院いただく方へ

1. 当日の持ち物

- ① 診療情報提供書(紹介状)
- ② 健康保険証
- ③ 診察券(当院の診察券をお持ちの方)

2. 検査予約日時

年 月 日 () 時 分

3. 来院時間

- ① 心臓冠動脈造影 CT 検査をお受けになる方は、検査予約時間の**2時間前**
- ② 上記以外の単純 CT、造影 CT 検査をお受けになる方は、検査予約時間の**10分前**

4. 検査結果

- 3. ②については当日、お渡しします。

5. 検査費用

概算で以下の通りです。ご参考にしてください。(加入されている保険によって異なります)

- ・単純 CT 検査…約 7000 円
- ・造影 CT 検査…約 12000 円
- ・心臓冠動脈造影 CT 検査…約 13000 円

● 交通のご案内

新宿駅から


小田急線急行利用
相模大野駅で各駅停車「江の島」行
に乗り換え東林間駅東口下車3分

横浜駅から

相模鉄道大和方面急行利用
大和駅で小田急線各駅停車相模
大野方面に乗り換え、東林間駅東
口下車3分

車利用の場合

国道16号線・中和田交差点から
東林間方面へ約2分。



さがみ林間病院 地域医療連携室

〒252-0385

神奈川県相模原市南区上鶴間 7-9-1

TEL 042(742)3577(代表) 042(742)3582 (検査予約直通)

造影 CT 検査に関する説明書

(患者様にお渡しください)

1. 造影 CT 検査とは

造影 CT 検査とは、ヨードを含む薬(造影剤)を血管内に注射しながら CT 検査を行なうものです。造影剤を使用することにより、病変の存在や形状などがより詳しく描出され、診断に大変役立ちます。造影剤を使用しなければ、病気を発見できない場合もあります。

2. 造影剤の副作用

ヨード過敏症の方は造影剤を使用できません。

造影剤を使用すると、まれに副作用が起こることがあります。アレルギーの既往があると副作用の起こる確率が高くなったり、喘息の既往があると喘息の発作が起きたり、喘息がひどくなったりすることもあります。

【軽い副作用】

頻度は約 100 人に1人以下

発疹・かゆみ・吐き気・嘔吐・くしゃみ・せき・頭痛などほとんどは検査直後に起こりますが、検査の1～2日後に発疹が現れることもあります。

【重い副作用】

頻度は約6000～9000人に1人

ショック・呼吸困難・腎機能障害など

3. 造影剤の注射について

造影剤が体内に入ると体が熱くなることがありますが、体の反応なので心配ありません。

4. 食事の制限について

予約検査の3時間前から食事はしないでください。ただし、水分の制限はありません。通常服用しているお薬は、医師から指示がないかぎり、いつも通り飲んでいただいてもかまいません。

5. 心臓冠動脈造影 CT 検査の前処置について

心臓が速く拍動してしまうと、検査の精度が落ちてしまうため、心拍数を安定させる目的で、検査の1時間半前にβブロッカー薬(ロプレソール)を使用します。来院後、血圧・脈拍を測定した上で内服していただきます。そのため、検査予約時間の2時間前にご来院ください。

内服後は1時間程、安静にしていいただきながら、血圧・脈拍を観察していきます。

また、ニトロ製剤(ミオコール)を口腔内に噴霧し、血管の状態を安定させて検査を行ないます。まれに副作用として血圧・脈拍の低下、頭痛、アレルギー症状が起こることがあります。

6. その他

当院では検査中、スタッフが常に患者様の様子を観察しており、副作用に対して万全の対応ができるようにした上で検査を行なっております。安心して検査をお受けください。

不明な点がございましたら、担当スタッフへお気軽にお申し出ください。

造影 CT 検査に関する説明及び同意書

1. 造影 CT 検査とは

造影 CT 検査とは、ヨードを含む薬(造影剤)を血管内に注射しながら CT 検査を行なうものです。造影剤を使用することにより、病変の存在や形状などがより詳しく描出され、診断に大変役立ちます。造影剤を使用しなければ、病気を発見できない場合もあります。

2. 造影剤の副作用

ヨード過敏症の方は造影剤を使用できません。

造影剤を使用すると、まれに副作用が起こることがあります。アレルギーの既往があると副作用の起こる確率が高くなったり、喘息の既往があると喘息の発作が起きたり、喘息がひどくなったりすることもあります。

【軽い副作用】

頻度は約 100 人に1人以下

発疹・かゆみ・吐き気・嘔吐・くしゃみ・せき・頭痛など

ほとんどは検査直後に起こりますが、検査の1～2日後に発疹が現れることもあります。

【重い副作用】

頻度は約6000～9000人に1人

ショック・呼吸困難・腎機能障害など

心臓冠動脈造影 CT 検査の前処置について（心臓検査の前処置がある場合にチェックをお願いします。）

心臓が速く拍動してしまうと、検査の精度が落ちてしまうため、心拍数を安定させる目的で、検査の1時間半前にβブロッカー薬(ロプレソール)を使用します。また、ニトロ製剤(ミオコール)を口腔内に噴霧し、血管の状態を安定させて検査を行ないます。

まれに副作用として血圧・脈拍の低下、頭痛、アレルギー症状が起こる可能性があります。

検査における危険性を含め担当医師から説明を受けて、同意します。

年 月 日 本人署名 _____

または代理人署名 _____

【医師記入】

年 月 日 医師署名 _____